

「アップニーク®ミニ点眼液 0.1%」による治療を受けられる方へ

1. 疾患の説明とあなたが受ける治療
<ul style="list-style-type: none">● アップニーク®ミニ点眼液0.1%（以下、本剤）は後天性眼瞼下垂の治療薬です。● 後天性眼瞼下垂は、加齢などのさまざまな原因によって上まぶたの筋肉の力が伝わりにくくなることで、引き起こされます。
2. 有効成分
<ul style="list-style-type: none">● 本剤はオキシメタゾリン塩酸塩を主成分とする点眼剤です。
3. 効能・効果
<ul style="list-style-type: none">● 本剤は、まぶたを上げる筋肉のひとつであるミュラー筋を収縮させることで、まぶたを上げます。
4. 副作用
<ul style="list-style-type: none">● 副作用として、まぶたのかゆみが報告されています。● <u>これらの症状、その他、異常を感じたときは、できるだけ早く医師に相談してください。</u>
5. 用法・用量（この薬の使い方）
<ul style="list-style-type: none">● 通常、成人には、1回1滴を1日1回点眼します。必ず指示された使用方法に従ってください。● 点眼し忘れた場合は、その日のうちであれば、すぐに1回分点眼してください。● 翌日に気づいた場合には、前日の分は点眼せず、1回1滴を1日1回点眼してください。● 1回に2滴点眼したり、1日に2回点眼したりしてはいけません。
6. 治療を受ける際の注意点
【治療開始前】 <ul style="list-style-type: none">● 次の人は、注意が必要です。治療開始前に、医師や薬剤師に伝えてください。<ul style="list-style-type: none">➢ 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある➢ 心臓や血管の疾患がある➢ 閉塞隅角緑内障である➢ 妊娠または妊娠している可能性がある➢ 授乳中である➢ 他に薬を使っている
【治療中】 <ul style="list-style-type: none">● 点眼後、一時的に目がかすんだり、まぶしく見えたりすることがあります。症状が生じた場合は、症状が回復するまでは自転車や自動車などの運転、機械の操作は行わないでください。必要に応じてサングラスをかけるなど、太陽の光や強い光を直接見ないようにしてください。● 治療期間中は、眼瞼下垂の症状を確認するため、定期的に受診してください。● 効果は、通常翌日には消失しますので、継続して点眼する必要があります。● 点眼によって改善が十分でない場合は、手術を検討します。
7. 自由診療に伴う注意事項
<ul style="list-style-type: none">● 本剤による後天性眼瞼下垂治療は自由診療であり、公的医療保険の対象ではありません。● 本剤による治療中の後天性眼瞼下垂に関する診察は、公的医療保険は適用されず自費の診療となります。● 本剤により副作用が起こった場合、副作用に係る治療費につきましても公的医療保険は適用されず自費の診療となります。● 本剤の副作用等で治療を中止した場合、一旦処方した点眼薬については原則として返品・返金に応じることはできません。

